

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十二 明周王朱橚 撰

傷寒門

傷寒陰陽剛柔症

論

夫傷寒症病之狀身熱足寒頸項強直惡寒頭面熱搖
頭卒口噤背脊反張是也此由肺熱移於腎轉而為瘧
瘧有剛柔太陽病發熱無汗而不惡寒為剛瘧發熱汗
出而惡寒為柔瘧診其脉沉細此為瘧也又論云太陽

病發汗過多因致瘥其狀令人搖頭發熱頸項強急腰身反張或瘥瘥口噤但謂之剛瘥者特以其無汗而反惡寒也柔瘥之狀搖頭發熱頸強急腰身反張或瘥瘥口噤與剛瘥同然謂之柔瘥者特以其自汗不惡寒故也瘥又謂之瘥者蓋瘥瘥一類古人特以強直名之又云傷寒瘥瘥何以名之瘥者筋脉急也瘥者筋脉緩也急則引而順緩則縮而伸或縮或伸動而不止者名曰瘥瘥俗謂之搐者是也 考內經曰病筋脉相引而急

名曰癰癰謂若契合之契也行則緩身則緊從則癰縱疾之從癰謂若放縱之縱也以急為緊以緩為癰理至明矣癰癰者風疾也而癰癰則癰癰焉傷寒癰癰者邪盛氣極也熱甚則風持併經絡風主動致四肢癰癰而寧也故風濕被火者則發微黃也劇者如驚癰時癰癰言其熱氣則劇盛也傷寒病瘥而發癰癰者病熱已過矣多難制治內經曰太陽終者戴眼反折癰癰絕汗乃出大如貫珠而汗不流是其癰癰為已過之疾也又有

四肢熱惡寒四肢動而不止似瘧癰而無力不得伸縮者也此為汗絕瘧癰之証雖難治若能以祛風滌熱之劑折其大熱則瘧癰亦有生者若妄加灼灸或引以發表之藥則死不旋踵經曰一逆尚引曰再逆促命期歌曰原來瘧病屬膀胱口噤如癰身反張此是傷風感寒濕故分兩証有柔剛瘧病無汗者剛葛根湯有汗曰柔桂枝加葛根湯二瘧並通用小續命湯口噤腳攣咬齒大承氣証治論柔瘧桂枝枯薑葛根湯

傷寒頸項強急身體反張屬太陽經先因傷寒又感寒

濕而致然也古人謂之瘧病

瘧音熾又作瘧巨郢反瘧者強直也古人以強直為

瘧金匱要畧太陽病其身體兀兀便瘧也

外證發熱惡寒與傷寒相似但其脉沉遲弦細而項背

反張強硬如發癰之狀此為異耳

新瘧血虛多汗也善中風亦有此症

當其有汗無汗以分剛瘧柔瘧

無汗惡寒名剛瘧有汗不惡寒名柔瘧

無汗葛根湯主之有汗桂枝加葛根湯主之

本草葛根主傷風有

濕開竅解肌

凡剛柔二瘕小續命湯並可與之

有汗者小續命去麻黃加葛根也

若審知剛瘕胃滿口噤其人卧不着席脚攣急咬齒當

行大承氣湯

外臺云熱而瘕者死熱病瘕者反折瘕瘕齒噤也

又問剛柔二瘕與陰陽二瘕是如何瘕亦作瘕陽瘕屬剛瘕陰瘕屬柔瘕附木散桂心白木湯附子防風散八物白木散桂枝煮散可選而用之

方

羌活散 治傷寒陰瘕筋節急硬陽瘕即易差陰瘕即難差

羌活 黃松木節剉 茯神 石膏 防風各一兩去蘆頭

王不留行 桂心各半兩 麻黃去根節一兩 當歸半兩剉微炒

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎至六分去滓不計時候溫服頻頻服後宜食荊芥葛根石膏豉粥避風如額上漸潤以厚衣蓋之汗出便瘥

附子散一名人參散 治傷寒陰瘕頸項強直四肢疼痛

足冷口噤

附子炮製去皮臍人參去蘆頭白茯苓前胡去蘆頭

白朮麻黃去根節桂心半夏湯浸七遍去滑

當歸炒各一兩半獨活一兩半石膏二兩乾薑半兩炮製剉

右為散每服五錢以水一中盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫頻頻服

白朮散 治傷寒陰痙手足厥冷筋脉拘急汗出不止

白朮桂心附子炮製去皮臍防風去蘆頭

芎藭甘草炙微赤剉各二分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時熱服

麻黃散 治傷寒陰陽瘕病頭痛壯熱百節痠疼吐逆

悶絕口噤腰背反張手足強直肉熱脉數

麻黃

一兩去根節

防風

一兩去蘆頭

赤茯苓

一兩

薤白

一兩

葛根

一兩半剉

獨活

一兩半

漢防己

芎藭

白蘚皮

牡丹

各三分

石膏

桑寄生

各一兩

甘草

三分炙微赤剉

黃芩

一兩

秦艽

一兩去蘆

右為散每服五錢以水一大盞煎至七分去滓入淡竹瀝一合更煎三兩沸分溫二服日三四服

治傷寒汗出後成陰陽瘕骨節煩痛不得屈伸近之即痛汗出短氣小便不利惡風身體微腫

附子

一兩炮製
去皮臍

白朮

三分甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗二枚煎至五分去滓不計時候溫服

白朮散 治傷寒陰瘕三日不瘥手足厥冷筋脉急汗

不出恐有氣內傷

白朮

白茯苓

麻黃

去根節

五味子

各半兩

桂心

三分

高良薑

一分剉

羌活

半兩

附子

三分

炮製去皮臍

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

柴胡散

治傷寒陰痙閉目頭面手足厥逆筋脉拘急

汗不止

柴胡

一兩半去苗

白朮

白茯苓

甘草

炙各三分

五味子

兩乾薑

炮製

附子

炮製去
皮臍

防風

各三分
去蘆頭

桂心

兩半

右為散每服五錢以水一大盞生薑半分煎至六分

去滓不計時候溫服

桂心散

治傷寒陽痿經二三日不瘥毒氣攻五臟心

神煩躁四肢疼痛

桂心

柴胡

去苗

赤茯苓

五味子

麥門冬

去心

栝榔

甘草

炙微赤

細辛

以上各
三分

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

羚羊角散 治傷寒陽瘕身熱無汗惡寒頭項強直四肢疼痛煩躁心悸睡不得寧

羚羊角屑 犀角屑 防風去蘆頭 茯神

柴胡去苗 麥門冬去心 人參去蘆頭 葛根剉

甘草炙微赤剉 枳殼各一分 麩炒去穰 石膏 龍齒各半兩

右為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓不計

時溫服

麥門冬散

治傷寒陽瘕身體壯熱項背強直煩燥發

熱惡寒頭面赤色四肢疼痛

麥門冬

去心麻黃去節

赤茯苓

知母

犀角屑

地骨皮

黃芩

赤芍藥

白蘚皮

甘草

炙微赤剉

杏仁

湯泡去皮尖雙仁用炒微黃各三分

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

龍齒散 治傷寒陽瘕通身大熱不渴煩悶頭疼

龍齒

前胡

去蘆頭
各三分

犀角屑

木通

子芩

各三兩

甘草

一分炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓入牛

黃末一字攪令勻不計時候溫服一方無甘草

石膏散 治傷寒陽瘕通身熱仰目頭痛

石膏

二兩

龍齒

一兩

犀角屑

前胡

去蘆頭
各半兩

秦朮

一兩
去苗

右為散每服五錢以水一大盞入豉五十粒葱白七

寸煎至五分去滓入牛黃末一字攪令勻不計時
候溫服

防風散

治傷寒陽瘕壯熱不歇筋脉拘急牙關急疼

防風

去蘆頭

木通

剉

麥門冬

去心

川升麻

以上各一兩

甘草

三分炙赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

芎藭散

治傷寒頭痛面色赤發熱形如中風常自汗

出嘔逆下之益煩心懊懣如饑發汗致瘕身強難以

屈伸

川大黃

剉碎微炒

芎藭

各一兩

獨活

二兩

柴胡

一兩半去苗

防風

三分去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計

時候溫服

白蘚皮散

治傷寒陽瘕壯熱不渴筋脉不能舒展牙

關疼急不欲見食

白蘚皮 百合 木通 防風 川升麻 各一兩

羚羊角 分三石膏 龍齒 各一兩半

右為麤末每服三錢以水一中盞入葱白七寸豉五

十粒煎至六分去滓不計時候溫服

龍齒散 治傷寒陽瘕通體大熱心神煩悸

龍齒 前胡 各一兩 犀角屑 半兩 牛黃 半兩 另研

麥門冬 一兩 去心焙

右為細末入牛黃同研令勻每服以竹瀝調下二錢

不計時候服

牛黃散 治傷寒陽瘕發熱急寒頭項強直四肢拘急

心神煩燥

牛黃

細研

麝香

細研

硃砂

細研

人參

去蘆頭

赤茯苓

防風

去蘆頭

芫薺

甘草

炙微赤剉

桂心

犀角屑

地骨皮

天麻

麥門冬

去心焙已上各一分

右為細散入牛黃朱砂麝香同研令勻每服不計時

候以竹瀝湯調下二錢

葛根湯 治太陽病無汗而熱小便短少氣上衝口噤
不得語欲作剛瘕

葛根

剉四兩

麻黃

去根節煎掠去沫焙

芍藥

各三兩

桂心

去粗皮

甘草

炙各二兩

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服取微汗

大承氣湯 治剛瘕胃滿口噤卧不着席兩脚攣急斷齒

大黃

剉四兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙半斤

枳實

去穰麩炒

右咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去

滓入芒硝末半錢再煎一兩沸溫服

石膏湯

治傷寒剛瘕身熱仰目頭痛項強

石膏

碎前胡

去蘆頭各一兩

犀角

鎔防風

去蘆芍藥

各半兩

龍齒

研二分

牛黃

研一錢

右粗搗篩每服五錢水一盞半入豉一百粒葱白五

寸煎至八分去滓不計時候溫服

羚羊角湯 治傷寒剛症渾身壯熱頭痛口噤筋脉拘

急心神躁悶

羚羊角銹 百合 芡翳 木通剉 葛根剉

升麻 黃芩去黑心 石膏碎 龍齒

各半兩

防風去蘆各

三分

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓不拘

時溫服日再服

神朮湯 治風濕惡寒脉緊解利無汗

蒼朮

防風

各二兩

甘草

一兩

右咬咀生薑水煎加葱白三寸治剛瘕加羌活獨活

麻黃

白朮湯

治風濕惡風脉緩解利有汗

白朮

三兩防風

二兩甘草

一兩

右咬咀每服秤三錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服無時

治柔瘕加桂心黃耆白朮

太陽陽明加川芎荆

芥穗 正陽陽明加羌活酒大黃 少陽陽明加
防風柴胡根 熱而在表者加黃芩 寒而在表
者加桂枝黃耆附子 熱而在裏者加大黃 寒
而在裏者加乾薑良薑附子 以上數經寒熱當
以脉別之

龍齒犀角湯 治傷寒剛瘕通身壯熱

龍齒 犀角 鎔前胡

去蘆頭 各一兩 牛黃一錢半

右四味將三味粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八

分去滓入牛黃少許不拘時溫服

犀角大黃散 治傷寒剛瘕壯熱頭痛筋脉不能展舒

犀角鎊大黃剉炒各一兩芡半石膏二兩牛黃研半

右四味搗羅為散入牛黃同研令勻每服一錢不拘

時淡竹葉湯調下

小續命湯 治傷寒剛瘕無汗惡寒口噤背強

麻黃去根節煎掠去沫桂心去粗皮甘草炙各半兩防風去蘆一分半

芍藥 白朮 人參 芡 附子 防已

黃芩

去黑心
各一分

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至一盞去滓入
生薑汁少許煎至一二沸溫服日三夜二若柔瘕
自汗者去麻黃夏病及病覺熱甚者減桂枝一半
冬及初春病去黃芩

栝蒌桂枝湯 治太陽病其証憊身體強兀兀然脉反

沉遲自汗此為柔瘕栝蒌桂枝湯主之

栝蒌根

二兩

桂枝

三兩

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

大棗

一十枚

右以水九升煮取三升溫頻服取微汗汗不出食頃

啜熱粥發之一方有葛根

桂枝加葛根湯 治傷寒柔瘕項背強几几反汗出惡

風

方見本門發汗吐下後脉証類

桂朮湯 治傷寒柔瘕手足厥冷筋急汗不止

桂

去粗皮一兩

白朮

人參

附子

炮製去皮臍各三分

防風

去蘆乾薑炮

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日二

附子白朮湯 治傷寒柔痙手足逆冷筋脉拘急汗出不止頸項強直搖頭口噤

附子

炮製去皮臍

白朮

各一兩

芎藭

獨活

去蘆頭

桂

去粗皮各半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分拍碎棗二枚擘破同煎至七分去滓溫服不拘時

五味子湯 治傷寒柔痙汗出身體強直手足多寒

五味子

炒一兩

附子

炮製去皮臍

木香

檳榔 各三分

白朮

桂

去粗皮

乾薑

炮

甘草

剉各半兩

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓食

後溫服晚再服

附子散

治傷寒柔痙身體直汗出不止腹內急痛

附子

炮製去皮臍

乾薑

炮

甘草

炙

桂

去皮

人參

各半兩

右搗羅為散每服二錢以薑粥飲調下不拘時

薑朮湯 治時行及傷寒後虛憊發即閉眼合面者柔

痊之候也厥冷筋脉急強汗出不止

乾薑

炮

白朮

桂

去皮各一兩

附子

炮製去皮臍

甘草

炙各半兩

防風

去蘆一兩

右剉如麻豆每服五錢用水一盞半煎至八分去滓

溫服

柴胡飲

治傷寒柔痊四肢逆冷汗不止腹中痛筋脉

急

柴胡去苗赤茯苓去黑皮檳榔煨五味子炒各半兩

桂去粗皮高良薑羌活去蘆頭各一分

右粗搗篩每服五錢用水一盞半煎至八分去滓溫服

茯苓湯 治傷寒柔瘕病經三日不差恐陰氣攻五臟致損

赤茯苓去皮五味子炒麥門冬去心焙柴胡去苗一兩半

桂去皮檳榔剉細辛去苗葉各半兩

右粗搗羅每服四錢水一大盞煎至六分去滓溫服
附子防風散 治傷寒柔痙閉目合面手足厥冷筋脉
拘急汗出不止

白朮 五味子 白茯苓 川芎 乾薑

炮製
剉

甘草 炙微赤剉 附子 炮製去皮臍 防風 去蘆各三兩 柴胡 一兩去苗

桂心 半兩

右剉散每服三錢水一盞生薑四片煎至六分去滓
溫服不拘時一方無川芎

羌活湯

治傷寒剛瘕閉目合面肢節急強身熱頭疼

羌活

去蘆頭

王不留行

桂皮去

黃松節

各一兩炒

當歸 焙

茯神

去木各三分

防風

去蘆

荊芥穗

各半兩

麻黃

去根節

石膏

各一兩半

右搗粗末每服五錢水一盞半煎至八分去滓不拘

時溫服良久葱豉粥投之出汗未汗再服以瘥為

度

桂枝加葛根枳實根湯

治有汗者柔瘥也

桂枝 芍藥 葛根 枳實根 各二錢半

右為末每服五錢水二小盞生薑七片棗二枚煎至一盞去滓溫服汗不出食頃啜熱粥發之一方加

羌活

桂枝加川芎防風湯 若發熱自汗而不惡寒者名柔

痊

桂枝 芍藥 生薑 各一兩半 甘草 防風

川芎 各一兩 大棗 六枚

右細剉每服一兩水三盞煎至一盞去滓溫服

桂枝加芍藥防風已湯 若發熱脉沉而細者附太陰也必腹痛又宜小續命湯

桂枝

一兩半

防風

防已

各一兩

芍藥

三兩 生薑

一兩半

大棗

六枚

右煎同前

麻黃加獨活防風湯 發汗太多因致瘧身熱足寒項

強惡寒頭熱面赤目腫赤頭搖口禁背反張者瘧病

也屬太陽 若頭低視下一足擗引肘膝相構陽明
瘕也 若一日或在左或在右邪視并一手一足指
搦者少陽瘕也汗之止之和之下之各隨其經當使
必效 若發熱無汗反惡寒者名剛瘕

麻黃

去節

桂枝

各一兩

甘草

半兩

杏仁

二十五粒

去皮尖

獨活

防風

各一兩

右細剉每服一兩水三盞煮至一盞半去滓溫服

小續命湯

傷寒病為瘕証如中風之狀手攣如弓搖

頭攏腦身體戰動要看其脉弱者小續命湯主之脉實則咬牙唇裂七孔出血急用大承氣湯下之口不開者用飭撇開灌之先要看大便虛實論下

麻黃

去節

人參

黃芩

白芍藥

川芎

甘草

杏仁

去皮尖

防已

官桂

各一兩

防風

一兩半

附子

炮五錢

右咬咀每服四錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎七分去滓溫服食前滓再煎此溫之重劑如剛症

去麻黃加乾葛

傷寒濕溫論

夫傷寒有五其一為中濕蓋風濕之氣中人為病發熱與病相類故曰濕溫此因汗出當風或因取冷過度致陰濕氣襲人肌膚流轉經絡其証喜汗出關節疼痛發熱而煩小便不利大便反快是謂中濕若風濕相搏則一身盡痛日晡轉劇濕熱相蒸則身心動黃肌治風濕者欲其微汗即風自解而濕自去濕甚者當利其小便

不可大發汗大汗則風去濕在其病不去亦不可下之
下之早則噦下之而利不止死診其脉當沉細難經曰
濕溫之脉陽濡弱陰小而急是也歌云其人濕氣素來
傷暑氣重傷病愈昌多汗妄言雙脰冷濕溫當辨脉陰
陽又云濕溫不可發汗發汗則死名曰重暍醫殺之也
宜朮附湯白虎加蒼朮湯如兩脰逆冷胃腹滿多汗頭
目痛苦妄言此名濕溫也其人嘗傷於濕因而中暑濕
熱相搏則發濕溫痛苦兩脰逆冷腹滿又胃多汗頭目

痛苦妄言其脉陽濡而弱陰小而急治在太陰

脾屬土主濕

不可發汗汗出必不能言耳聾不知痛所在身青面色
變名曰重暍如此死者醫殺之耳白虎加蒼朮湯主之

此方出傷寒論云亦如一身盡痛發熱身黃小便不利
名金匱白虎加桂湯

大便反快者此名中濕也風雨襲虛山澤蒸氣人多中
濕濕流關節即身體煩痛其脉沉緩為中濕脉細者非
也主身盡痛發熱身黃小便自利者朮附湯若小便不
利大便反快者當利其小便宜甘草附子湯五苓散主

之至真要論云治濕之法不利小便非其治也金匱要
畧云濕家身煩痛可與麻黃湯加白朮四分發其汗慎
不可以火攻之濕家須身體痛不可大發汗汗出則作
痙大抵中濕者水之蒸氣及汗出當風取冷過度或中
霧露與風寒氣合者曰痺皆由經於濕而後挾以異氣
其寒多者為痛為浮腫非附子桂朮不能去也其風多
者為煩熱為流走為拘急非麻黃薏苡烏頭輩不能散
也其中氣為堅滿為癰閉非甘遂葶藶枳實白朮不能

泄也其肢體痛不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫此名風濕也脉浮為風濕是風氣與濕氣相搏肢體痛重不可轉側額上微汗不欲去被或身微腫欲發汗但熱熱身潤則風濕俱去若大發其汗則風氣去濕氣在矣麻黃杏仁薏苡甘草湯防己黃耆湯桂枝附子湯桂枝加白朮湯甘草附子湯朮附湯杏仁湯敗毒散可選而用之身腫者甘草附子湯加防風

方

麻黃杏仁薏苡仁甘草湯 治濕溫一身盡痛發熱日

晡即劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

麻黃

去根節三兩煎去沫

杏仁

去皮尖雙仁三十枚炒

薏苡仁

兩

甘草

炙一兩

右㕮咀每服五錢水一鍾半煎至八分去滓溫服避

風微汗

加朮麻黃湯 治濕家身煩疼發其汗為宜慎不可以

火攻之

麻黃

去根節
三兩

桂

去皮
二兩

甘草

炙一兩

杏仁

去皮尖雙
仁七十枚

白朮

四兩一方
用蒼朮

右咬咀每服五錢水一盞半煎取七分去滓溫服微

取汗

防己黃耆湯 治風濕脉浮身重有汗惡風者并治風

水脉浮身重而不渴者

防己

四兩

黃耆

五兩

甘草

炙二兩

白朮

三兩

右咬咀每服五錢以水一盞半入生薑半分拍碎大

棗二枚擘破同煎取七分去滓溫服日三喘者加
麻黃胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂下有陳
寒者加細辛服後當如蟲行皮中腰以下如水後
坐被上又以一被遶腰以下溫令微汗瘥

杏仁湯 治風濕身體疼痛惡風微腫

杏仁

去皮尖雙仁炒一十五枚

桂皮

去根節先煮

麻黃一二沸焙乾

芍藥

天門冬

去心各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分煎至七分

去滓不拘時溫服

溫風丸 治濕溫身寒身涼脉短日逐有汗者下虛上

攻頭目昏痛者

白附子

陽起石

滑石

各一兩

寒水石

四兩燒

右搗研為末用糯粥飲和丸如梧桐子大每服二十

七丸用荊芥木香湯下

安息香丸

治濕溫傷寒四五日後汗出肢體冷

安息香

錢一

五靈脂

二兩半

麻黃

去根節半兩

附子

七個

巴豆去皮醋
煮半兩

右四味搗為末研巴豆為膏入衆藥丸如彈子大每服一丸麩炭上燒存性生薑湯化下

茵陳五苓散 治傷寒濕溫熱病感冒後發為黃疸小便赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥不對証因感濕熱病以致偏身發黃予常用茵陳五苓散治之甚妙

右用生料五苓散一兩加入茵陳半兩車前子一錢

木通一錢半柴胡一錢半酒後得証加乾葛二錢
咬咀和勻分作二服每服水一盞燈草五十莖同
煎八分去滓食前服渣再煎連進數服小便清利為

愈五苓散

方見本門傷寒煩渴類

白虎加蒼朮湯 治濕溫多汗

知母

六兩炙

甘草

二兩

石膏

一斤

蒼朮

三兩

梗米

三兩

右剉散每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

癸丑年故人王彥龍作昆陸倉官季夏得疾旬月

項多汗兩足逆冷譫語醫者不曉雜進藥已經旬
予診之其脉關前濡關後數予曰當作濕溫治蓋
先受暑後受濕暑濕相搏是名濕溫先以白虎人
參湯以次白虎加蒼朮湯頭痛漸減足漸溫汗漸
止三日愈此病多賊邪誤用藥有死之理有醫難
曰何名賊邪予曰難經論五邪有實邪虛邪正邪
微邪賊邪從後來者為虛邪從前來者為實邪所
不勝來者為賊邪從所勝者為微邪自病者為正

邪曰假令心病中暑為正邪中溫得之為賊邪今
心先受暑而實邪勝之水尅火不勝所謂之賊邪
五邪之中最逆也難經又曰濕溫之脉陽濡而弱
陰小而急濡弱見於陽部濕氣搏暑也小急見於
陰部暑氣蒸濕也故經曰暑濕相搏名濕溫是賊
邪也不特此也予素有停飲之疾每至暑月兩足
汗熱熱未嘗乾每服此藥二三盞即愈

茯苓白朮湯 治濕溫

茯苓 乾薑 甘草 白朮 桂各錢半

右水二盞煎至八分去滓服

麻黃加葛根湯 治太陽表病風濕相搏榮衛俱病一身盡痛表氣不和當汗而解之風隨汗出值天陰雨不止濕氣不除後微發其汗風濕皆去也

杏仁去皮尖二粒 麻黃 桂枝 葛根各一兩 甘草半兩

右剉細每服五錢或一兩以水三盞煎至一盞去滓溫服之

知母乾葛湯 治風濕身體內熱甚者

知母三錢乾葛八錢石膏六錢姜豉五錢甘草炙黃芩

木香 升麻 生南星 人參 防風 杏仁炒

川芎 羌活各二錢麻黃四錢
炮焙

右咬咀每服五錢水一盞半煎一盞服

桔萎根湯 治風濕加渴者

桔萎根三錢石膏二兩生葛根一兩半乾人參 防風

甘草炙各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎一盞服

傷寒汗後餘熱不除論

夫傷寒陰陽受病毒氣未除其人已經服藥出汗之後而脉洪大實數腹內脹滿小便難或煩或渴面色變赤此為臟腹有結熱故也

方

柴胡散 治傷寒得汗後熱不除朝暮壯熱

柴胡

去苗

赤芍藥

黃芩

梔子仁

枳殼

麩炒微黃去穰

麥門冬

去心人參去蘆頭

赤茯苓

石膏

葛根剉

甘草

炙微赤剉以
上各三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服不拘

時

羚羊角散

治傷寒已得汗而熱不除

羚羊角屑

一分犀角屑

一分麥門冬

半兩去心

柴胡

半兩去苗

地骨皮

半兩木通

半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服不

拘時

黃耆散

治傷寒得汗後熱不除發熱肢節煩疼

黃耆

剉 鱉甲

醋塗炙冷 去裙襴

人參

去蘆 頭

柴胡

去苗

赤茯苓

桑根白皮

本通

剉

羚羊角屑

知母

麥冬

去心

地骨皮

甘草

炙赤各 三分

赤芍藥

白朮

枳殼

麤炒各 一兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

溫服

知母散 治傷寒發汗及吐下後煩熱不除滿悶頭痛

口乾渴逆

知母 川升麻 麥門冬去心 人參去蘆頭 黃芩

葛根剉各三分 甘草

炙赤半兩剉

鱉甲

醋塗炙冷去裙襴

石膏

半兩

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

又方

葛根

剉

麥門冬

去心

黃芩

川升麻

地骨皮

各一兩

甘草

炙赤半兩剉

石膏

半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不計時

溫服

秦艽散

治傷寒汗後餘熱不除四肢拘急胸膈不利

嘔逆不思飲食

秦艽

一兩去苗

柴胡

一兩去苗

枳殼

麩炒微黃去瓢三分

麥門冬

去心一兩

桑根白皮

三分剉

葛根

三分剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分蘆根五寸

煎至六分去滓不計時溫頻服

大黃散 治傷寒雖得汗後熱不除心腹煩滿大小便

秘澁

川大黃

剉碎微炒
一兩半

柴胡

去苗
三分

赤芍藥

三分
黃芩三分

犀角屑

三分
鱉甲

一兩醋塗炙
冷黃去裙襴

川升麻

三分
知母

赤茯苓

檳榔

各三分

杏仁

三分浸去皮
尖雙仁炒黃

木通

剉一兩

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓不計時溫

服如人行十里再服通利為度

人參散

治傷寒汗後熱不除進退發渴身體溫濕心

神煩悶口乾舌澀不思飲食

人參

去蘆頭

葛根

犀角屑

梔子仁

麥門冬

去心

柴胡

去苗

地骨皮

黃芩

甘草

炙微黃

川升麻

玄參

赤茯苓

以上各一兩

右為細散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不計時

溫服

黃芩散

治傷寒七八日汗後餘熱不除

黃芩

人參

去蘆頭

柴胡

去苗

葛根

剉以上各一兩

梔子仁

兩半

甘草

炙微赤半兩剉

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去

滓不計時溫服

解肌散

治傷寒汗後餘熱不除

知母

川升麻

天門冬

去心

黃芩

葛根

柴胡

去苗各一兩

石膏

一兩半

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

溫服

治傷寒得汗後熱不除心神煩躁

赤茯苓

一兩半

人參

去蘆頭三分

甘草

炙微赤剉半兩

麥門冬

去心一兩

黃芩

一兩

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不計時

溫服

治傷寒得汗後熱不除內有熱實腹脹煩躁宜服此方

柴胡

去苗二兩

川大黃

剉碎微炒一兩

赤芍藥

半兩

枳殼

三分炒微黃

半夏

半兩湯洗七遍去滑焙

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓不計時溫服

犀角散 治傷寒汗後心肺熱不除

犀角屑

半兩麝香兩

細研半兩

牛黃

細研半兩

人參

去蘆頭

麥門冬

去心焙

天竺黃

朱砂

細研

黃芩

梔子仁

甘草

炙赤以上各一分

右為細散入麝香牛黃天竺黃朱砂再研令勻每服

二錢以竹葉煎湯調下不計時溫服

茯神丸 治傷寒汗後熱不除心神不安

茯神一麥門冬去心焙 羚羊角屑 梔子仁

白鮮皮 川升麻 玄參以上各二分 車前子半兩

鐵粉分半細研 朱砂半兩細研

右為末與鐵粉朱砂同研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每於食後煎桑根白皮湯下二十九

治傷寒汗後餘熱不除頭痛內熱

出聖惠方

麻黃

去根節
一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

雞子

一枚
去殼

右細剉麻黃甘草二味水一大盞半先煎取一盞去

滓下雞子攪令勻更煎三兩沸不計時放微溫分

二服

治傷寒十日已上曾發汗未解煩熱不除

大青

二兩

甘草

炙微赤
剉一兩

麥門冬

去心
一兩

右為散末每服五錢水一大盞入豉半合煎至五分

去滓不計時溫服

柴胡飲子 治解利大人小兒傷寒

柴胡 黃芩 人參 甘草 升麻 地骨皮

赤茯苓 赤芍藥 草龍膽

各半兩

右咬咀每服四錢水一盞加薄荷沙糖同煎七分溫服不計時小兒分作三服

人參散 傷寒汗下後餘熱不退或煩或渴面赤者

人參 梔子 藍葉 甘草 白蘚皮

各半兩

右剉細每服五錢水煎服

治傷寒發汗後身上餘熱未退

麻黃

去節根

芍藥

細辛

牡丹皮

去心

前胡

去毛

山茵陳

官桂

荊芥穗

桔梗

麥門冬

去心

羌活

各一分

右細搗羅為末每服二錢食後熟湯調下

木通散

治傷寒汗下後足腫有濕氣不除者

木通

木香

檳榔

獨活

各一兩

丹參

七錢

右剉細每服五錢水煎服

枳實芍藥乾薑甘草湯 治傷寒汗下後氣逆利不止者寒也

芍藥 甘草 枳實炒 乾薑炮

各半兩

右剉細每服五錢水煎服

防葵散 治傷寒汗下後臍左有動氣者

防葵一兩 木香五錢 柴胡 黃芩各半兩

右剉細每服五錢水煎服

枳殼散 治傷寒汗下後臍上有動氣者

枳殼

五錢
麩炒

赤茯苓

一兩
當歸

京三稜

一兩
炮

木香

五錢

阿膠

五錢

右為細末每服五錢沸湯點服

前胡散

治傷寒汗下後臍右有動氣者

前胡

赤茯苓

各一兩

大腹皮

人參

各五錢

木香

三錢

檳榔

大黃

各三錢

右為細末每服五錢沸湯點服

茯苓散

治傷寒汗下後臍下有動氣者

赤茯苓

一兩

檳榔

三錢

桂心

大腹皮

川茴香

炮炒

良薑

各五錢

右為細末每服五錢沸湯點服如有不治傳為積熱
治之難痊不可汗下也

調中散 治傷寒喫藥轉病熱已減然大腑餘熱出後
終未快精神昏悶宜服此

柴胡

前胡

去毛

桔梗

貝母

去心

牡丹皮

去心

黃芩

麻黃

各一分

枳殼

只用青

梔子

各四銖

升麻

半兩

甘草

一分

右細搗羅為末每服三錢水一盞煎兩三沸食後臨
卧去滓任意服

治傷寒汗後虛熱

用葦草剉研取生汁飲一合愈

傷寒煩躁論

夫傷寒煩躁者此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少
陰病惡寒而踈時自煩欲去其被者可治也病已解而
反發暴煩者由病新瘥強食為脾胃尚虛不能消也故

令微煩損穀即愈少陰病脉微細沉但欲卧汗出不煩
時自吐五六日自利煩躁不得卧寐者死發汗後下之
脉平而小煩者此新虛不勝穀氣故也又云傷寒陽氣
多陰氣少病發於陽經者故令煩躁其候身熱而煩渴
引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有少陰經煩躁者當
辨傷寒煩躁者為擾擾而煩躁為憤躁之躁合而言之
煩躁為熱也析而分之煩也躁也有陰陽之別焉煩陽
也躁陰也煩為熱之輕者躁為熱之甚者有煩痰煩滿煩

渴虛煩皆以煩為熱也有不煩而躁者為怫怫然便作躁悶此為陰勝隔陽也凡大躁欲于泥水中卧但飲水入口者是也所謂煩躁者謂先煩漸至躁也所謂躁煩者謂先發躁而迤邐復煩者也煩躁之由又為不同有邪氣在表而煩躁者有邪氣在裏而煩躁者有因火劫而煩躁者有陽虛而煩躁者有陰盛而煩躁者皆不同也經曰當汗不汗其人煩躁太陽中風脉浮而緊不汗出而煩躁大青龍湯主之此是邪氣在表而煩躁者也

病人不大便六七日繞臍痛煩躁發作有時此有燥糞也邪氣在裏而煩躁者也太陽以火熏之不得汗其人必躁太陽病二三日及躁火熨其背令人大汗出大熱入胃躁煩者火劫令煩躁者也陽微發汗躁不得眠與下之後後發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表証脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之及發汗若人之病仍不去煩躁者茯苓四逆湯主之是陽虛煩躁者也少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯

主之是陰盛而煩躁者也諸如此者証之常也非逆也
設或結胸証悉具煩躁者死發熱不利厥逆躁不得卧
者死少陰病吐利煩躁四逆者死少陰病四逆惡寒而
趺脉出不煩而躁者死少陰病五六日自利復煩躁
不得寐者死是數者又皆為不治之証嗚呼煩躁為常
有之疾復有諸不治之証臨病者之側又當熟審焉歌
括云煩躁來時熱氣升陰為陽勝大陽經陽明燥糞連
臍痛腎微陽虛陰躁乘心主火腎主水心熱則煩腎熱

則躁傷寒煩躁則有陰陽虛盛之別焉陰虛而陽盛則為煩陽虛而陰盛則為躁有先煩漸加燥者有先躁後復煩者煩其熱之輕躁則熱之甚也或邪在表或邪在裏或陽盛或陰盛或火邪條例不一當詳審而調理之太陽証煩躁寸關脉浮數身熱是也風寒俱勝其脉浮緊無汗而煩躁當汗不汗其人煩躁並用大青龍湯心中悸而煩躁小建中湯熱七八日渴欲飲水五苓散無熱但狂言煩五苓散水調之劇吐之自汗不煩小便數

不可與桂枝湯只用芍藥甘草湯服桂枝後汗出煩渴其脉洪大白虎加人參湯陽明証煩躁以多日不大便有燥糞故臍痛而煩躁也以承氣湯隨輕重用少陰証煩躁尺寸俱沉厥冷自利是也心煩不得卧黃連雞子湯黃連阿膠湯吐利厥煩躁欲死吳茱萸湯茯苓四逆湯下利咽痛心中煩滿猪膚湯下痢嗽嘔煩渴不得眠猪苓湯惡寒而踈時而自煩欲去衣被大柴胡湯太陽病以火熏之而不得汗亦至煩躁或火熨脊背令人汗

出大熱入胃煩躁並黑豆煎湯解之汗後煩不得眠欲
水者少與之小便不利與五苓散下後晝煩夜靜不嘔
不渴凡表証脉沉微乾薑附子湯若兼懊懣即與梔子
豉湯發汗若下之病仍不解而煩躁茯苓四逆湯吐汗
下後虛煩心下痞滿氣上衝胸頭眩筋動身為振搖茯
苓桂枝白朮甘草湯虛煩附入胸滿條瘥後胃弱不能
勝穀亦致微煩減穀則愈仍與小柴胡湯陰極發躁或
陰毒用火熨灸及投熱藥以發躁者並不可誤用涼藥

當仍以熱劑可用四逆湯以回陽蓋身微熱煩躁面赤
脉沉而微此名陰証似陽也陰發躁熱發厥物極則返
也大率以脉為主諸數為熱諸遲為寒凡如此最驗也
假令身微熱煩躁面赤其脉沉而微者皆陰証也身微
熱者裏寒故也煩躁者陰盛故也面戴陽者下虛故也
若醫者不看脉象虛陽上隔煩躁誤以為實熱與涼藥
則氣消成大病矣外臺秘要云陰盛煩躁名曰陰躁欲
坐井中宜以熱藥治之仲景少陰症面赤者四逆加葱

白主之身冷脉細沉疾煩躁而不飲水此名陰盛隔陽也傷寒陰盛隔陽者病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者是也若欲引飲者非也不欲飲水者宜服下辟保正散須臾躁止得睡汗出即瘥此藥通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈大焰散丹砂丸並主之傷寒論陰盛隔陽病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者又云大抵陰毒本因腎氣虛寒或因冷物傷脾外感風寒則陽氣不守遂發頭痛腰重腹痛眼睛疼身體倦怠四肢逆冷汗

不止或多煩渴精神恍惚若誤服涼藥則渴轉甚燥轉急有此病者便急服辛熱之藥或時鄭聲指甲青黑面赤若陰毒已深病勢困重六脉附骨取之則有按之則無但於臍中用葱熨法或着艾三壯而手足不溫者不可治也守真云或下後熱不退或畜熱內甚陽厥急深以至陽氣怫鬱不能營運于身表四肢以致遍身清冷痛甚不堪項背拘急目睛赤疼昏眩恍惚咽乾或痛燥渴虛汗嘔吐下利腹滿實痛煩冤悶亂喘息鄭聲以其

虛熱極深而脉沉細欲絕者也未明其造化之理而煩傳於陰毒或失下熱極以致身冷脉微而昏冒將死欲急下之則殘陰暴絕陽氣後靜而立死不下亦死病人至此命懸頃刻然則治法當如何曰此當涼膈散或黃連解毒湯養陰退陽但欲虛熱漸漸宣散則心胸腹滿脉漸以生至于脉復有力可以三因承氣湯微下之或解毒加大承氣湯尤良俗未明此故認作陰症是以陰陽失其治也素問曰五運行氣論岐伯曰氣有餘則制

以所勝而侮所不勝不及則制所以勝侮而乘之已所
勝輕而侮之木餘則制土輕侮於金金氣不爭故木恃
其餘而欺侮也又木少金勝土反傷木以木不急妄凌
之也四季同侮謂侮謾而凌忽之也又云以火煉金熱
極反化為水

犀角散

出聖惠方

治傷寒四肢煩躁頭疼口乾壯熱

犀角屑

甘草

炙微赤剉

枳殼

麩炒微黃去穰

赤芍藥

麥門冬

焙去心

赤茯苓

葛根

剉以上各半

石膏

二兩

右搗篩為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不

計時候溫服

麥門冬散

出聖惠方

治傷寒熱盛口乾煩躁不得汗

麥門冬

半兩
去心

人參

半兩
去蘆

麻黃

一兩
去根節

梔子仁

三分

生乾地黄

半兩
雨

赤茯苓

半兩
雨

甘草

一分
炙微赤剉

木香

一分

黃芩

一分

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞入生薑半分

煎至六分去滓不計時候溫服

升麻散

出聖惠方

治傷寒身體痠痛頭面如火心胸煩躁胃

膈壅悶不思飲食

川升麻

三分葛根

一兩剉

前胡

一兩去蘆頭

馬牙硝

一兩

子芩

半兩知母

半兩赤芍藥

半兩犀角屑

半兩甘草

半兩炙

微赤剉

玄參

半兩麥門冬

去心各一兩

大腹皮

一兩剉

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時溫服

猪苓散

出聖惠方

治傷寒發汗後大下胃中乾煩躁不得眠

卧欲得飲水者少與飲之令胃和則愈若脉浮小便利微熱燥渴者勿服

猪苓

去黑皮

白朮

澤瀉

桂心

各一兩

赤茯苓

二兩

右搗細羅為散每服二錢不計時以粥飲調下

知母散

出聖惠方

治傷寒頭疼鼻塞痰壅四肢壯熱增寒怵

惛煩躁

知母

一兩

麥門冬

去心一兩

川升麻

一兩

桔梗

半兩

去蘆頭

犀角屑

半兩

柴胡

去苗一兩

貝母

半兩

令微黃

赤茯苓

半兩

地骨皮

一兩半

木通

半兩

赤芍藥

半兩

石膏

二兩

右搗羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時溫服

子苓散

出聖惠方

治傷寒身體疼痛頭面如火胸中煩躁胃

膈壅悶不思飲食

子苓

半兩

麥門冬

一兩

葛根

半兩

川升麻

一兩

前胡

一兩

玄參

半兩

犀角屑

半兩

赤芍藥

半兩

檳榔

半兩

馬牙硝

一兩

右搗粗羅為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時溫服

茵陳散

治傷寒後復熱在心煩躁恍惚或多驚恐及不得眠卧

茵陳

茯神

梔子仁

赤芍藥

麥門冬

去心

黃芩

以上各三兩

犀角屑

一分生乾地黃

一兩

右搗粗羅為散每服五錢以水一大盞入生薑半分

去滓不計時溫服

治傷寒得汗後身熱未退心神煩躁

梔子仁

甘草

炙微赤剉

黃蘗

剉各一兩

右搗粗羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服

治傷寒煩躁不得睡卧方

酸棗仁

微炒一兩

甘草

微赤剉一兩

豉

一合

右搗篩水一大盞半煎至一盞去滓不計時分三溫

服

治傷寒未得汗發煩躁心悶

麻黃

一兩去根節

甘草

半兩炙赤剉

桂心

兩

麥門冬

半兩去心

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

稍熱服覆衣出汗如人行十里未有汗再服

梔子仁散

治傷寒五六日心膈煩躁壯熱不得卧

梔子仁

川升麻

柴胡

去毛石膏

生乾地黄

甘草

炙微赤剉

葛根

剉以上各一兩

右搗粗羅為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時溫服一方無甘草名梔子升

麻散

不灰木散 治傷寒得汗及未得汗煩躁悶亂

不灰木

二兩用牛糞火燒通赤

延胡索

子芩

黃藥

各半兩

甘草

三分炙微赤剉

甘菊花

半兩

羌活

半兩

右搗細羅為散每服二錢用淡漿水一中盞煎至六

分不計時和滓服之

葛根散 治傷寒煩躁乾逆

葛根

剉

枳殼

麤炒微黃去穢

川大黃

剉碎微炒

麥門冬

去心

甘草

炙微赤剉

檳榔

以上各半兩

右搗粗羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不計時溫服

茯苓四逆湯 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者

白茯苓

去黑皮四兩

人參

一兩

附子

一枚生去皮臍破八片

甘草

二兩

乾薑一兩半

右剉如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫

服

吳茱萸湯 治傷寒少陰病吐利手足冷逆煩躁欲死者

吳茱萸

湯洗焙
炒一升人參二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑棗大切大棗二枚

擘煎至八分去滓溫服日三

知母湯 治傷寒煩躁不解脉大喘熱頭疼

知母

栝蒌根

甘草

微炙一兩

石膏

二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入粳米少許煮米熟去滓溫服不拘時

黃芩散 治傷寒頭痛大熱煩躁

黃芩

去黑心

玄參

各二兩

大黃

剉炒

甘草

炙剉

枳殼

去穰麩炒

升麻

一兩

半焙

右搗羅為散每服二錢熱水調下

大黃湯 治傷寒心神煩躁壯熱狂言毒氣留於胸膈

大黃

剉炒黃連

去鬚

甘草

炙各半兩剉

麥門冬

去心焙

柴胡

各一兩去苗

右搗篩每服三錢水一盞入竹葉十片生薑三片煎至六分去滓溫服不拘時

葛根散

治傷寒煩躁退熱

葛根

剉黃耆

剉

甘草

炙剉各五兩

石膏

研三兩

小梔子仁

八兩

右搗研為散每服二錢新汲水入蜜調下

大安丸 治傷寒煩躁悶亂

凝水石

半斤煨赤黃土焙兩宿取水研末用菠薐汁和作餅陰乾再研又和又陰二次為度

朴硝

四兩甘草二兩炙剉為末

右同研勻細用菠薐汁和丸難丸即入少許炊餅丸如彈子大又一等如梧桐子大每服一丸生地黃汁化下如復躁時即化大丸子下小丸子十五丸只一服即定如急迫無地黃汁新水化下

不灰木散 治傷寒大熱煩躁悶亂

不灰木

二兩

滑石

研

凝水石

研

板藍根

一兩

甘草

生各

一兩

右搗研為散每服二錢用生米泔化乳糖一棗大調

下

雞清散

治傷寒煩躁悶亂不解

用鬱金二枚生用一枚煨熟一枚共搗羅為散以新汲水一盞生雞子清一枚調勻頓服取利一行躁熱立定

八石散

代赭石

三兩

凝水石

甘草

炙判另為末

不灰木

各八兩

金星石

銀星石

雲母

石膏

太陰元精石

各四兩

陽起石

一兩生另研

右除陽起石甘草外餘八味固濟瓷罐中嵌口約一

秤炭火煨赤頻將代赭出醋中淬五度去火候冷

取出濕地上紙襯盆合土蓋兩宿搗羅更細研三

二日入陽起石甘草末伴勻每服半錢至一錢生

薑蜜水或新汲水調下

凝水石丸

治寒躁悶口乾時渴狂言亂道

凝水石

半斤用炭火半秤燒半日取出放濕土上出火毒研兩日令極細以磁器盛於井中

浸一龍腦研

研砂各一分

甘草

炙剉為末一分

天竺黃

半兩研

右研勻細糯米粥和丸如彈子之大每服一九生薑

蜜水化下

梅紅湯

治傷寒煩躁狂言咽膈壅悶口乾多渴

烏梅肉

炒

知母

焙

貝母

去心

藿香葉

五味子

蛤粉

人參

赤茯苓

去黑皮

大黃

剉

甘草

炙剉各一兩

右粗搗篩每服三錢水一鍾入小麥竹葉煎至六分
去滓溫服

必效散 治傷寒熱盛狂躁悶亂欲發黃皮發瘡疹熱
毒氣盛口乾煩躁

生地黃

生地膽草

生龍膽草

並碎絞取汁三件共一盞同浸

剉碎甘草末一兩候汁盡陰乾

波稜

紫葉肥者去莖陰龍半兩

龍腦

一錢研

牛黃

半錢研

右搗羅甘草波稜為末與牛黃合研每服二錢研林

擒絞取汁新汲水相和勻調服如大段躁熱及欲發黃即另入龍腦少許相和雞子清調服小兒服或半錢

鉛霜散 治傷寒三日後心煩躁熱狂言

鉛白霜

一分馬牙硝一兩

右研勻每服半錢生薑蜜水調下小兒服一字

蘆根湯 治傷寒陽毒五六日以上但胸中燥熱乾嘔

躁悶

蘆根

兩一知母焙

桔萎根

柴胡

去毛

黃芩

去黑心

甘草

右粗搗篩每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服不拘時

龍膽湯

治傷寒溫病後煩躁

龍腦

萎蕤

芍藥

黃芩

去黑心

石膏

升麻

麻黃

去根節

甘草

炙剉各三分

葛根

一兩

桂皮

去粗皮

大青

各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑一棗大拍碎煎至

六分去滓溫服

人參湯

出聖濟總錄

治傷寒七八日汗後心煩躁渴

人參

黃芩

去黑心

柴胡

去毛

葛根

剉各一兩

山梔子仁

甘草

各半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半生薑一棗大拍碎煎

至七分去滓不計時溫服

硝石丸

出聖濟總錄

治傷寒煩躁身熱譫妄

硝石

半兩

丹砂

一分

右細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一九生糯米汁

入油一兩點化藥青柳枝攪勻服

神應散

出聖濟總錄

治傷寒陰陽不和順發煩悶亂氣虛乾

逆

丹砂

研

石硫黃

研各一錢

上硝

錢一蛤粉

三錢半

人參

白茯苓

去黑皮各一分

右搗羅為散每服一錢用芝蔴水調下不計時服

紫金散

治傷寒有熱煩躁不安者

焰硝

八兩硫黃

四兩代赭石

三兩甘草

三兩焙

右為散更於白中治之生薑蜜水和方寸匕服之其躁即止

知母湯 治陽明病身冷而內煩者

知母 葛根 白朮 甘草

炙各一兩

右剉以水三升煮取一升五合去滓溫服五合

治發熱惡寒大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力或目痛鼻乾者非白虎湯症也此血虛發躁故也

黃耆


一兩當歸身二錢

右咬咀水煎服

治傷寒服藥搶心煩躁

出本草

以豉一升梔子仁四枚剉水三升煎取一升分三服



普濟方卷一百三十二

欽定四庫全書

子部
普濟方卷一百三十三

詳校官太醫院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣王鍾泰

謄錄監生臣崔鶴立

欽定四庫全書

普濟方卷一百三十三

明

周王朱楠撰

傷寒門

傷寒煩渴

論

夫腎者水臟膀胱者津液之腑二經為表裏傷寒熱入於臟流於少陰之經則腎受病矣水惡燥熱盛則燥故渴而引飲又傷寒邪氣非發汗吐下則不能除治發汗吐下過甚則致津液耗少熱氣内生亦令渴也傷寒病

煩渴者此謂經發汗吐下已後臟腑空虛津液竭絕腎家有餘熱故使其煩渴也傷寒渴者裏有熱也傷寒之邪自表傳至裏則必有名証隨其邪淺深而見焉雖曰一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日在腹六日入胃其傳經者又有証形焉太陽主氣而先受邪當一二日發頭項痛而腰脊強者是矣太陽傳陽明則二三日發身熱目疼鼻乾不得卧也陽明傳少陽三四日胸膈痛而耳聾此三陽皆受病為邪在表而猶未甚作

熱故不言渴至四五日少陽傳太陰則邪氣漸入裏寒邪漸成熱當日之時也津液耗少故腹滿而噎乾至五六日太陰傳少陰是裏熱又漸深也當此之時則津液為熱所傳漸耗而乾故口燥舌乾而渴及至六七日則少陰之邪傳於厥陰厥陰之為病消渴為裏熱已極矣所謂消渴者飲水多而小便少是謂熱能消水也所謂傷寒病至六七日而渴欲飲水為欲愈之病以其傳經已盡故也是以厥陰病云渴欲飲水少少與之愈者是

也邪氣初傳入裏熱氣散漫未收斂成熟裏蒸焦膈傳耗津液遂成渴也病人雖渴欲飲水又不可多與之若飲水過多熱少不能消故復為停飲諸疾經曰凡得時氣病至五六日渴欲飲水水飲不能多勿多與也何者以腹中熱尚少不能消之便更與人作病也若大渴欲飲水猶當依証與之與之常令不足勿極意也言能飲一斗與五升又曰渴欲飲水少少與之但以法救之渴者宜五苓散至於大渴欲飲水數升者白虎加人參湯

主之皆欲潤其燥而生津液也凡得病反能飲水此為欲愈之病其不曉病者但聞病飲水自差小渴者乃強與飲之因成大禍不可復救然則悸動也交結也喘咳噎噦乾嘔腫滿不利小便不利數者皆是飲水過傷而診病之工當須識此勿令悞也歌括云熱氣薰蒸津液耗少所以發渴熱邪深淺條例不同然是渴者大熱裏有熱也或曰六經外証獨少陰曰渴厥陰曰煩何邪少陰屬腎主水熱氣深腎水易竭焉得而不渴厥陰屬肝

心之母也病主消渴飲水多而小便少是其裏熱也極已子氣乘母於是挾心火以為煩惟煩則消矣凡煩証用藥並去半夏以其煩躁而逐水也若先嘔後渴者則為欲解當與之水先渴後嘔者則為水停心下屬赤茯苓湯活人書曰脉浮渴屬太陽寒表不解心下有水氣而渴者小青龍去半夏加栝蒌湯太陽病服桂枝大汗出後大煩渴者白虎加人參栝蒌脉浮小便不利微熱消渴者五苓散傷寒四五日身熱惡風脇下滿手足溫

而渴者小柴胡半夏加人參栝蒌根主之太陽証身體
拘熱而渴者小柴胡去半夏為風溫栝蒌根湯主之有
汗而渴者屬陽明白虎加人參湯主之虛人老人及春
秋月可與竹葉石膏湯陽明病但頭汗出小便不利渴
飲水漿身必發黃茵陳湯小柴胡去半夏加人參栝蒌
根湯傷寒身熱或發熱惡風而渴屬少陽少陽脇下硬
不大便而舌上白胎而渴小柴胡去半夏加人參栝蒌
根湯自利而渴屬少陰傷寒熱入於臟流於少陰之經

少陰主腎腎惡燥故渴而飲引少陰下利咳而嘔汁猪
苓湯主之不利欲飲水者以有熱也白頭翁湯主之切
戒太陽証無汗而渴者不可與白虎湯仲景云渴欲飲
水無表証者白虎加人參湯脉浮發熱無汗是表未解
也不可與白虎湯意以小青龍去半夏加栝蒌也傷寒
四五日身熱惡風脇下不滿手足溫而渴者小柴胡去
半夏加栝蒌人參也陽明証汗多而渴者不可與五苓
散汗多胃中燥者茯苓復利小便故也意以竹葉湯與

之仲景云陽明病發作者有時汗出多言急下之然太陽病渴終不可與白虎湯陽証得汗後脉洪大而渴者方可與之也陽明病渴終不可與五苓散陽明証小便不利汗少脉浮而渴者方可與之此皆仲景之妙也仲景猪苓湯証亦云脉浮發熱渴飲水小便不利者猪苓湯主之凡病非大渴不可與水小渴咽乾者小小飲滋潤之令胃中和若大渴煩躁甚能飲一斗者與五升飲之若全不與則乾燥無由作汗發喘而死常人見因渴

飲水得汗小渴遂劇飲之致停飲心下滿結喘死者甚衆當以五苓散或陷胸丸與之金匱要畧云得時氣至五六日而渴欲飲水水不能多不當與也何者以腹中熱尚少不能消之便更為人作病矣至七八日大渴欲飲水猶當依証與之常令不足勿極意也凡人但見仲景云得病反能飲水此為愈遂小渴者乃強飲之因成其禍不可勝數大抵傷寒水氣皆因飲水過多所致水停心下氣上乘心則為悸為咳結於胸脇則為水結胸

胃中虛冷則嘔為噦令氣相搏則為噎上迫於肺則為
咳漬入腸中則為利邪熱所搏畜於下焦則為小便不
利小腹滿或裏急溢於皮膚則為腫若陽毒倍常燥盛
大渴者黑奴丸主之中暑伏熱深累取不瘥其人發咳
不已酒蒸黃連丸主之傷寒有所不利者行之取其滲
泄也渴而飲停者有燥而煩渴者有病氣去而水氣不
得行者其表裏得見煩躁口燥欲飲水水入即病氣去
而水氣不得亂頭痛發熱身疼痛欲飲水者有發熱汗

出復惡寒不嘔心下痞者並宜五苓散其脉浮發熱渴欲飲水小便不利少陰病下利六七日咳而嘔渴心煩不得卧者宜與猪苓散其大病瘥後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散此利水道滲洩之意也口燥咽乾脾臟有熱則津液短少故令口燥而舌乾仲景云傷寒無熱口燥渴而煩背微寒者白虎湯加人參也又云陽明病渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之若咽乾者慎不可發汗發汗則重亡津液少陽症口苦咽乾者小柴

胡主之少陰証口燥咽乾者急下之病人默默欲眠目不能閉起居不安其聲嘶或咽乾者當作狐惑治之狐惑証在第十一卷第十三問

方

人參散 治傷寒大汗後煩渴熱不解脉大者

人參

一兩去蘆頭

知母

一兩甘草

半兩炙微赤剉

石膏

二兩

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時溫服

猪苓湯 治傷寒脉浮發熱渴欲飲水小便不利

猪苓

去黑皮

赤茯苓

秦朮

去蘆頭

滑石

澤瀉

以上各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時溫服

犀角散

出聖惠方

治傷寒身體大熱小便黃赤煩渴不止心

中悶絕言語錯亂睡多驚恐

犀角屑

一人參

三分去蘆頭

赤茯苓

半兩

茵陳

半兩

細辛半兩陳橘皮半兩湯浸去白穰麻黃半兩去根節

甘草半兩炙微赤剉

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時溫服

黃芩散出聖惠方治傷寒吐下後內外有熱煩渴不止

黃芩人參去蘆頭甘草炙微赤剉麥門冬去心柴胡去苗

葛根以上各半兩剉桂心半兩

右搗粗羅為散每服二錢水一中盞入生薑半分棗

二枚煎至五分去滓不計時溫服

枯薑根散

出聖惠方

治傷寒大腸秘澁煩躁不止

枯薑根

一兩

黃芩

一兩

人參

半兩

去

川大黃

一兩

剉碎微炒

梔子仁

半兩

川芒硝

一兩

甘草

半兩

炙微赤剉

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時服如人行十里再服以利為度

治傷寒下後煩渴宜服此方

出聖惠方

麥門冬

一兩

五味子

一兩

人參

一兩

去蘆頭

甘草

一兩炙微赤剉
聖濟作半兩

石膏

一兩

右搗粗羅為散每服三錢水一中盞煎至五分不計

時去滓溫服

土瓜根散

出聖惠方

治傷寒煩渴不止

土瓜根

一兩

麥門冬

一兩去心

甘草

半兩炙微赤剉

枇杷葉

半兩拭去毛炙
微黃聖濟作一兩

右搗粗羅為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不計時溫服聖濟名麥門冬飲

黃耆散

出聖惠方

治傷寒煩渴不止

黃耆

剉

麥門冬

去心

黃芩

葛根

剉

柴胡

去苗

人參

去蘆

枇杷葉

拭去毛炙微黃

梔子仁

赤茯苓

赤芍藥

甘草

炙微赤剉各半兩

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時溫服

茵陳散

出聖惠方

治傷寒頭項汗出身體無汗小便不利渴

欲飲水者是瘀熱在裏身欲發黃

茵陳

梔子仁

川大黃

剉碎微炒

滑石

木通

剉以上
各一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右搗粗為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓不

計時溫服如人行十里再服以小便快利為度

石膏湯

出聖
惠方

治傷寒已大汗後不利其人煩渴不解其

脉洪大

石膏

知母

地骨皮

甘草

炙微
赤剉

人參

去蘆頭
各一兩

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞入粳米一百粒

煎至五分去滓不計時溫服

麻黃散

出聖惠方

治傷寒壯熱煩渴頭痛

麻黃

去根節

葛根

剉

知母

柴胡

梔子仁

陳橘皮

湯浸去白穰焙

甘草

炙微赤剉以白穰焙上各半兩

石膏

二兩

右搗粗羅為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時溫服

麥門冬散

出聖惠方

治傷寒下後上氣煩渴不止

麥門冬

去心

五味子

人參

去蘆頭

葛根

剉

甘草

炙微赤剉

石膏

芡實

桑根白皮

剉各一兩

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時溫服

半夏散

出聖惠方

治傷寒嘔吐煩欲飲水

半夏

三分湯洗七遍去滑

蘆根

一兩剉

赤茯苓

澤瀉

三分

桂心

半兩

甘草

一分炙微赤剉

麥門冬

三分去心

右搗粗羅為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎

至五分去滓不計時溫服

治傷寒頭痛骨節酸疼或已吐下餘熱不盡口乾煩渴

麻黃

去根節一兩

知母

一兩半

葛根

一兩剉

甘草

一兩炙微赤剉

石膏

二兩半聖濟作一兩半

右搗粗羅為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓

不計時溫服聖濟名葛根麻黃湯

竹茹飲子

出聖惠方

治傷寒吐利後煩渴不止

青竹茹

一雞子大

人參

半兩去蘆頭

烏梅肉

二枚

右藥細剉水一大盞煎至五分去滓不計時溫頻服

青箱子丸

出聖惠方

治傷寒後熱結在胸膈煩渴

青箱子

二兩外臺作五兩

黃芩

一兩外臺作三兩

龍膽草

梔子仁

一兩外臺作二兩

苦參

剉一兩外臺二兩

黃蘗

剉一兩

右搗羅為末鍊蜜為丸如梧桐子大每服溫水下三

十九外臺秘要有黃連二兩忌豬肉冷水

治傷寒心神熱燥口乾煩渴

出聖惠方

秦艽

一兩去苗

右細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時溫分

二服

又方

出聖惠方

枯薑

二兩

右搗粗羅為散每服三錢水一中盞入新竹葉二十

七片煎至五分去滓不計時溫服聖濟不用竹葉

知母湯

出聖濟總錄

治傷寒數日不解心躁煩亂小腹脹急

臍下悶痛大渴喘

知母

焙

芍藥

麥門冬

去心

柴胡

去苗

澤瀉

各三

分

石膏

一兩半

黃芩

去黑心

甘草

炙各

半兩

右搗粗篩每服三錢水一盞入生薑一棗大拍碎竹

葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

葛根飲

出聖濟總錄

治傷寒頭痛躁渴不得眠睡四支煩痛

葛根

剉

黃芩

大青

石膏

碎

人參

各一兩

甘草

炙半兩

右搗粗篩每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

葛根石膏湯

出聖濟總錄

治傷寒下後頭疼口乾煩渴

葛根

剉

麥門冬

去心焙

黃芩

去黑心

升麻

各一兩

石膏

碎一兩半

甘草

炙半兩

右粗搗篩羅每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服

不計時

黃芩蘆根湯

出聖濟總錄

治傷寒吐下後內外有熱煩渴不

止

黃芩

去黑心

蘆根

人參

赤茯苓

去黑皮各一兩

桂

去粗皮半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半入生薑一棗大拍碎

棗三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時

芍藥黃連湯

出聖濟總錄

治傷寒溫病吐下有餘熱煩渴不

止

黃芩

去黑心一兩

芍藥

黃連

去鬚

麥門冬

去心焙各三分

栝蒌根

半兩一分

甘草

右粗搗篩每服三錢用水一盞煎至六分去滓食後

溫服

葛根鬱金湯

出聖濟總錄

治傷寒熱氣薰蒸臟腑煩渴飲水

不休

葛根

剉

鬱金

剉

石膏

碎

荊芥穗

各一分

甘草

炙一錢

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨

卧溫服

升麻飲

出聖濟總錄

治傷寒煩躁大渴飲水不休

升麻

黃芩

去黑心

葛根

剉

柴胡

去苗

山梔子仁

荊芥穗

牡丹皮

黑牽牛

各一分

黃連

去鬚

硝石

研各一分

右粗搗篩九味入硝石和勻每服三錢水一盞煎至

七分去滓溫服食後臨卧

黃連九

出聖濟總錄

治傷寒時氣煩渴飲水不止

黃連

去鬚

枯薑根

各一兩

葛根

半兩

右搗羅為末鍊蜜九如梧桐子大每服三十九煎大

麥溫湯下不拘時

茯苓地黃湯

出聖濟總錄

治傷寒後胃熱引飲煩渴不止

赤茯苓

去黑皮

生乾地黃

焙

枯薑根

各一兩

知母

焙半兩

麥門冬

焙一兩
半去心

右粗搗每服五錢水一大盞入小麥百粒淡竹葉三

五片棗三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時

土瓜根湯

出聖濟
總錄

治傷寒毒氣上攻津液燥少大渴引

飲

土瓜根

甘草

炙半兩

豉半合

右並細剉分為三服每服用水一盞半入大棗二枚

擘破同煎至七分去滓食後溫服

枯薑九

出聖濟總錄

治傷寒後體虛心脾積熱口乾煩渴

枯薑根

黃連

去鬚

茯神

去木

麥門冬

去心

焙各一兩

桑根白皮

剉

犀角屑

人參

地骨皮

鐵粉

黃芩

去黑心各三兩

甘草

炙半兩

右搗羅為末鍊蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每服

三十九食後煎小麥湯下

知母犀角湯

出聖濟總錄

治傷寒後煩渴飲水無度日漸瘦

悴

知母

焙

犀角屑

升麻

各半兩

石膏

碎三分

右細剉每服五錢以水一盞半入竹葉三七片小麥五十粒同煎七分去滓入土瓜根汁栝蒌根汁各半合攪勻食後溫服

黃芩飲

出聖濟總錄

治傷寒汗後煩熱躁不止

黃芩

去黑心

桑根白皮

剉各三兩

葛根

剉一兩

甘草

炙半兩

麥門冬

去心焙一兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

猪苓湯

出聖濟總錄

治傷寒煩渴小便不利

猪苓

去黑皮剉

赤茯苓

去黑皮

滑石

碎

葛根

剉

澤瀉

剉各等分

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓不計

時溫服

柴蘇丸

出聖濟總錄

治傷寒霍亂發熱煩渴

柴蘇葉

各二兩

藿香葉

各二兩

乾木瓜

不入鹽者

人參

甘草

微炙剉各一兩

白茯苓

去黑皮三兩

桂

去粗皮半兩

右為細末入麝香二錢同研令勻鍊蜜和丸如櫻桃
大每服一九嚼破以溫水下不計時

主傷寒渴

用栝蒌根三兩以水五升煮取一升分二服清淡竹
瀝一升水二升煮好銀二兩減半去銀先與病人
飲之然後服栝蒌湯其汁須冷服

黃芩人參湯 治傷寒吐下後內外有熱煩渴不安

黃芩 人參 甘草 桂心 生薑

各二兩

大棗

十五枚
擘破

右剉以水八升煮取三升分三服徐徐服忌菰菜海

藻生葱等物

栝蒌根湯 傷寒餘熱不止渴欲飲水

栝蒌根

黃芩

各二兩

人參

桂心

大黃

甘草

炙芒硝
各二兩

右剉以水八升煮取三升去滓飲一升須臾當下不

下復飲一升得下不止勿復飲湯藥力執歇乃可

食糜耳一方用生薑二兩忌海藻松菜生葱油膩等物

高堂丸 治傷寒苦渴煩滿欲死令極飲水法

大黃

二分硝石三分熱

釜底黑

一分竈突中黑一分黃芩一分

梁上塵

一分麻黃

二分去節竈中黃土

一分

右八味篩末蜜和如彈丸著一盞水中盡用服之則自極飲水汗出則熱除矣一名黑奴丸一名駐車丸并療溫瘧神良

增損白朮散

出德生堂

止渴順氣下食生津宜服之

白朮

乾葛根

茯苓

藿香葉

人參

木香

各一兩

陳皮

二兩

乾生薑

一錢

右㕮咀每服四錢水一大盞半煎至七分去滓溫服

不拘時或涼服亦可

春澤湯

出御藥院方

治傷寒不解表裏發渴飲水小便赤澀

陰陽不分疑二之間急難用宜服此藥

澤瀉

三錢

猪苓

三錢

赤茯苓

白朮

各二錢

官桂

一錢

人參 柴胡 麥門冬 各二錢
去心

右㕮咀如法修製每服五錢水盞半燈草二十根同

煎八分去滓空心服

竹葉湯 治兩尺浮身無大熱鬱胃或下利煩渴者

柴胡 四兩 黃芩 麥門冬 去心 甘草 人參

茯苓 各二兩 小麥 竹葉 一把

右剉以水一斗先煮竹葉小麥減四升去小麥竹葉
內諸藥煮取三升去滓溫服一升大便實者加大

黃二兩

黃連厚朴湯

出德生堂

治傷寒發熱煩渴自得病一日二日

後大便自利日夜不止

黃連

三錢

厚朴

二錢

右咬咀用生薑一小塊切碎同藥和為一處以酒半杓勻砂鍋內漫火炒藥以酒乾為度去生薑作一服用水一盞半煎七分去滓溫服粗再煎此藥

五苓散

出指南方

治中風發熱六七日不解而煩有表裏証

渴欲飲水水入則吐名曰水逆及主時行熱病但狂言煩躁不安精彩言語不與人相當者

猪苓

去黑皮

赤茯苓

去黑皮

白朮

各三分

桂

去粗皮半兩

澤瀉

一兩

右搗羅為散每服二錢白湯調服訖多飲熱湯有汗出即愈

猪苓湯

治少陰病下利六七日欬而渴嘔而煩不得

眠

猪苓

去黑皮

赤茯苓

去黑皮

阿膠

炙燥

澤瀉

滑石

各一兩

右剉碎每服三錢水一盞煎六分去滓溫服

黃連解毒湯

出德生堂

治傷寒或經汗下後有大熱煩渴錯

語不得睡及上焦虛炎口舌生瘡咽喉腫痛心膈煩躁不安

黃柏

黃芩

黃連

山梔子

各一兩

右呖咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服未退再服之

奪命獨參湯

同前

治傷寒汗下後終日昏悶不省人事發

熱發渴似有狂言一切危急之証宜服此藥服後額

上微汗是其應也

揀苦參

一兩

右㕮咀作一服用水一升煎至七分去滓溫令隨意

不拘時服粗再煎亦可嚼滋益

升麻葛根湯

同前

治傷寒身熱發渴在表

升麻

白芍藥

葛根

甘草

各等分

右呖咀水煎溫服如在裏宜小柴胡湯並加瓜蒌根
治傷寒消渴

用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分為二服

傷寒虛煩論

夫傷寒虛煩者心中鬱鬱而煩也有胃煩有心中煩有
虛煩諸如此者皆熱也若止云煩者表熱也及其邪熱
傳裏故有胃中煩心中煩虛煩之別三者要在觀其熱
所從來審其虛實而治為不同也如不經發汗吐下而

煩者則是傳經之熱不作膈實者但與和解而已故經
曰心煩喜嘔或胃中煩而不嘔者小柴胡湯主之少陰
病二三日心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之少陰病
胃滿心煩者猪膚湯主之是皆和解而徹熱者也若因
吐下發汗後而煩者則是內陷之煩但與湧吐而已下
後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊懣者梔子
豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子
生薑豉湯主之心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主

之丸藥天下後身熱不去微煩者梔子乾姜湯主之是
皆取其吐而湧其熱者也虛煩之狀必中溫溫然欲吐
憤憤然無柰欲其不嘔擾擾亂亂是名煩也非吐則不
能已經曰若下後更煩心下濡者為虛煩也梔子豉湯
主之脉作結心下滿而煩饑不能食病在胃中瓜蒂散
主之二者証均煩也藥均是吐也而有輕重之不同吐
下發汗後邪氣乘虛而入煩者則謂之為虛煩與梔子
豉湯則是吐劑之輕者不因吐下發汗後邪氣結胃中

則為膈實與瓜蒂散則是吐劑之重者又陽明病不吐不下心煩者則是煩之實者也與調胃承氣湯下之傷寒二三日心中悸心煩者則煩之虛者也與小建中湯補之煩為熱也悸而煩復為主者以悸為虛悸甚而煩故為虛也少陽之邪入腑者煩而悸則為熱也大抵先煩而悸者是為熱也先悸而煩者是為虛也內經曰治病必先求其本誠哉是言也又云傷寒病後躁煩者有虛煩有穀煩陽氣偏多謂之虛煩病瘥後食穀太早心

虛不勝穀氣胃內蒸熱謂之穀煩若陰陽和調則虛煩
自己損其穀食則穀煩者瘥活人書云不惡寒身不痛
頭不疼脉不緊但煩熱者此多虛煩諸虛煩熱與傷寒
相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭
不疼脉不緊數故知非裏實也不可下如此者內外皆
不可攻攻之必遂損竭多死者也此虛煩但當與竹葉
湯若嘔者與橘皮湯一劑不愈再與之孫真人云此法
數用甚有效傷寒虛煩宜服王叔和云有熱不可大攻

攻之熱去則寒起並宜服竹葉湯

方

竹葉湯 治虛煩狀似傷寒但不身疼痛不惡寒或得汗亡津液燥熱未解內外皆不可攻者汗與竹葉湯嘔與橘皮湯渴與五苓散

竹葉

半把

石膏

碎四兩

半夏

湯洗去滑

人參

半兩

麥門冬

去心二兩

甘草

炙半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半入粳米一百

餘粒生薑半分拍碎同煎取八分去滓溫服并解暑毒陰証傷寒未解人勿服若表裏俱虛下利發熱去石膏加附子煎名既濟湯濟生除石膏粳米加茯苓小麥治傷寒大霍亂吐瀉後心虛煩悶

梔子豉湯

出聖濟總錄

治傷寒發汗後虛煩不得眠劇者必

反覆顛倒心中懊懣宜服梔子豉湯又傷寒發汗若下之煩熱胸中窒痛亦宜服梔子豉湯又傷寒下利後更煩按之心下濡者虛煩也亦宜服之發汗若下

之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之仲景云用梔子豉湯病人舊微溏者不與之

梔子

十四枚
去皮

豉四合

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服得快吐止後服

烏梅湯

同前

治傷寒大病瘥後體虛煩滿

烏梅

取肉

山梔子仁

甘草

炙

葛根

各半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞入豉二七粒同煎至半

盞去滓早晚食後溫服

麥門冬飲

同前

治傷寒汗後虛煩心神不寧

麥門冬

去心焙

柴胡

去苗

防風

去蘆

半夏

湯洗去滑薑汁製

赤茯苓

去黑皮

犀角

鎊各半兩

右搗粗篩每服五錢水一盞半入生薑五片煎至八

分去滓溫服

人參湯

同前

治傷寒汗後虛煩心中滿悶腹脹微喘

人參

白茯苓

去黑皮

杏仁

去皮尖雙仁細研各半兩

右除杏仁外剉如麻豆大每服三錢水一盞半入粳米百餘粒同煎米熟去滓溫空心服

麥門冬湯

同前

治傷寒後不解或寒或熱四肢瘦弱飲食

不能胸中煩滿虛躁

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

人參

白朮

各一兩

桂

去粗皮半兩

陳橘皮

去白炒一兩

甘草

炙半兩

地骨皮

黃耆

剉各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

日再

厚朴飲

同前

治傷寒發汗後氣虛心煩腹滿痰逆不思飲

食

厚朴

二兩去粗皮薑汁製

甘草

炙

半夏

薑汁製

人參

陳橘皮

去白焙各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑五片同煎至七

分去滓空心服

薏苡仁湯

同前

治傷寒汗後煩滿多睡小便赤色

薏苡仁

酸棗仁

防風

去蘆

人參

甘菊花

地骨皮

紫蘇子

甘草

炙

白茯苓

去黑皮各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞入荊芥薄荷生薑各少

許同煎七分去滓溫服睡多冷服不睡熱服

人參飲

前同

治傷寒汗後煩滿氣虛心神不寧

人參

赤茯苓

去黑皮

陳橘皮

去白焙

白朮

剉炒各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服日三

麥門冬茯苓飲

同前

治傷寒後煩滿心神恍惚不得眠卧

麥門冬

去心焙

赤茯苓

去黑皮

知母

焙

芎藭

酸棗仁

微焙

陳橘皮

去白焙

檳榔

剉

甘草

炙各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑五片煎至一

盞去滓溫服日三

柴胡湯

出聖濟總錄

治傷寒後虛勞煩熱驚悸不得眠睡

柴胡

去苗半兩

酸棗仁

微炒二兩

遠志

去心一分

當歸

防風去蘆

人參

生乾地黄

芎藭

各半兩

麥門冬

去心焙半兩

甘草炙茯神去木猪苓去皮桂去粗皮黄耆剉各半兩

右粗搗篩每服三錢水一大盞生薑三片煎至七分

去滓溫服空心日二服

人參湯同前治傷寒後虛勞不得眠煩悶四肢乏力

人參兩一酸棗仁微焙當歸切焙芎藭剉桂去粗皮

甘草炙柴胡去苗白茯苓去黑皮石膏碎各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半生薑三片煎至一盞

去滓食前溫服

六神湯

同前

治傷寒虛煩不安

人參

白茯苓

去黑皮

防風

去蘆

百合

黃耆

剉

乾山芋

各二兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不

拘時

酸棗仁湯

同前

治傷寒後虛煩不得眠卧頭目昏眩

酸棗仁

炒三兩

麥門冬

去心焙二兩

地骨皮

剉一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞生薑三片同煎至七分

去滓溫服不拘時

茯神散

同前

治傷寒後虛煩心腹不快

茯神

去木

紫胡

去苗

陳橘皮

去白焙

甘草

炙各

一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎取八分去滓溫服

不拘時

黃連一物湯

同前

治傷寒不解恐服藥太多大小便不利

虛煩不安

黃連

一兩剉碎生薑數片入酒少許微炒

右作一服水一碗煎七分去滓徐徐冷熱皆可服
一物黃連瀉心湯 易老隨証加減列於後

煩者加梔子 燥者加香豉 嘔者加半夏

滿者加甘草 腹痛加芍藥 脉遲加附子

大便秘加酒浸大黃

用乾薑附子先煎另熱不僭也後另煎黃連與黃連
薑附同用少陰渴逆者失下也陰消將盡陽逆上
行使陰不納也或舌孿言語不正及昏冒與咽喉

痛者少陰也速下之大承氣湯若陽極脉微將盡者不宜下宜瀉心湯涼膈散去硝清肺亦可飲水多心下痞渴別則無惡候者五苓散主之

地仙散

同前

治大病後煩熱不安及一切虛勞煩熱病宜服之

地骨皮

去木
二兩

防風

去蘆
一兩

甘草

炙半
兩

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎八分不拘時溫服

枳實柴胡湯

出濟生方

治虛煩昏悶嘔逆惡心往來寒熱胃

膈捫之即痛日晚所發潮熱者

枳實

半兩麩炒令紫色取瓤

柴胡

去苗二兩

黃芩

一兩半

人參

半兩

甘草

炙一兩半

右杵為粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚

同煎至七分去滓溫服日三不拘時

大橘皮湯

出活人書

治動氣在下不可發汗發汗則亡陽心

中大煩骨節疼痛目運惡寒食則反吐穀不得入先

服大橘皮湯吐止後服小建中湯

甘草

炙半兩

人參

一分

竹茹

半升

橘皮

一兩半
去白

右剉麻豆大每服五錢生薑四片棗子一枚水二盞煎取一盞去滓分二服

傷寒譫語

論

夫傷寒不應發汗而汗之遂致亡陽津液內耗胃中燥實令譫語此或由津液不和內有燥屎或三陽合病或瘀熱蓄血在裏或婦人熱入血室皆使譫語則身當有

熱脉屬胃胃者足陽明經也陽明為病主身熱故譫語
妄言則身當有熱脉當洪大而洪大亦陽脉也故其病
為順若譫語而手足四厥脉反沉細而微者為逆也然
又有鄭聲者取其鄭重之意與譫語相類蓋古人以此
分虛實醫者當以脉證參合別之不可不慎故謂虛則
鄭聲實則譫語傷寒四五日脉沉喘滿沉為在裏而反
發汗其津液越出大便為難表虛裏實久久則成譫語
發汗後重發其汗亡陽亦為譫語其脉反和者不死陽

明病下血而譫語者此為熱入血室但頭汗出當刺期門隨其實者而瀉之澼然汗出者則愈病苦譫言妄語人身熱脉當洪大者生沉微細手足四逆者死也傷寒譫語何以明之譫者謂喃喃而語也又狂譫謂妄有所見而言也斯皆真氣昏神緒不清之所致夫心藏神而主火病則熱氣歸焉傷寒胃中熱盛上乘於心心為熱胃則神昏亂而語言多出識昏不知所以然遂言無次而成譫妄之語輕者睡中呢喃重者不睡亦語言差謬

有謔語者有獨語者有狂語者有語言不休者有言亂者此數者見其熱之輕重也謔語與獨語雖間有妄錯之語若與人言有次是熱未至於極者也經曰獨語如見鬼若劇者發則不識人是病獨語未為劇者狂語者熱甚者也由神昏而無所見覺甚則至於喊叫而言語也言語不休者又其甚也至於言亂者謂妄言罵詈善惡不避親疎為神明已亂也經曰諸逆發汗微者難差劇者言亂是難可復制也謔語之由又自不同皆當明

辨之有被火劫譫語者有汗出譫語者有下利譫語者
有下血譫語者有燥屎在胃譫語者有三陽合病譫語
者有過經譫語者有亡陽譫語者經曰大熱入胃中水
竭燥煩必發譫語又腹滿微喘口乾咽爛或大便秘則
譫語是因被火劫譫語者汗出譫語此為風也須下之
過經可下之下之若早語言必亂以表虛重實故也是
汗出譫語者也下利譫語者有燥屎也小承氣湯主之
是下利譫語者也下血譫語者此為熱入血室當刺期

門隨其虛實而瀉之是下血譫語者也譫語潮熱不能食者胃中必有燥屎五六枚也是謂燥屎在胃譫語者也腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿是三陽合病譫語者也過經譫語者熱也當下之是過經譫語者也發汗多亡陽譫語不可下與柴胡桂枝湯和其榮衛是以有通津液後自愈是亡陽譫語也諸如此脉短則死脉自和則愈又身微熱脉浮大者生逆冷脉沉細不過一日死實則譫語氣收斂在內而實者本病也或

氣上逆而喘滿或氣下奪而自利者皆為逆也經曰直視譫語喘滿者死下利者亦死謂其正氣脫絕也能知虛實之診能識逆從之要治病療病則不失病人有譫語有鄭聲二証鄭聲為虛當用溫藥白通湯主之譫語為實當須調胃承氣湯主之服調胃承氣湯而譫語止或更衣者停後服不爾再與之仲景云實則譫語虛則鄭聲重語也世多不別然譫語鄭聲亦相似難辨須更用外證與脉別之若大小便利手足冷脉微細者必鄭

聲也大便秘小便赤手足溫脉洪數者必譫語也以相
參然後用藥萬全矣大抵傷寒不應發汗即譫語仲景
云傷寒四五日脉沉而喘滿沉為在裏反發其汗津液
越出大便為難表虛裏實則譫語譫語屬胃胃和則愈
不和煩而躁宜服調胃承氣湯然亦有三陽合病譫語
者三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢譫語
遺尿其脉必滑石不可汗下宜白虎湯有胃實譫語者
病人身發熱汗出大便硬為胃實宜調胃承氣湯大承

氣湯大承氣湯去芒硝尤穩或汗發多亡陽譫語者仲
景云發汗多亡陽譫語者不可下此為津液不和與柴
胡桂枝湯和其營衛以通津液後自愈恐人作燥屎攻
之不可攻也下利譫語為有燥屎脉不微細即須下之
用小承氣湯譫語而利不止則不治又汗出譫語者風
也須候其過經乃下之瘀血譫語者狂言漱水大便黑
小便多遍身黃小腹滿緣當汗蓄熱在裏熱化為血故
爾輕者犀角地黃湯重者桃仁承氣湯抵當丸有下後

譫語者傷寒八九日下之胃煩滿驚小便不利譫語身
重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯有婦人熱入血室
譫語者婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語
如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦速用
小柴胡湯治之若行陽遲致入胃冷津燥中焦上不榮
成血塊結胃狀須當針期門也若婦人中風發熱惡寒
經水適來入血室也當刺期門隨其實而取之已上二
焦熱結在期門也若犯胃氣盡夜譫語喜妄小腹滿小

便利屬抵當湯也發少陽汗則譫語經云汗之則譫語甚謂少陽也下之則額上汗手足逆冷謂下之早也發汗多亡陽譫語不可下柴胡桂枝湯主之火劫譫語口乾煩躁喘滿小柴胡加黑豆大便秘譫語不惡寒反惡熱白虎湯又問仲景云無犯胃氣何也答曰熱因經水適來乘虛入實故血室有熱遂令譫語當以小柴胡解之則與胃實譫語不同胃實有燥糞故宜調胃承氣湯下之若血室有熱譫語非胃家實仲景恐人作胃實攻

之故曰無犯胃氣也大抵譫語是熱屬陽反見陰証者
逆

方

枳實湯 治傷寒脉沉在裏而反發汗津液越出大便
難甚表虛裏實遂發譫語其人如狂

枳實

去瓤
熬炒

木香

各一
分

朴硝

三
分

大黃

剉微炒
一兩

甘草

炙半
兩

右粗擣篩每服五錢水盞半煎至七分去滓溫服

犀角湯 治傷寒邪熱在胃譫言妄語身體壯熱

犀角鎊 大青 人參各三分 遠志去心一分 升麻一兩半

柴胡去苗 甘草炙剉半兩 黃芩去黑心各一兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎蘆根茅根各五寸同煎至半盞去滓溫服一方無生

薑

芡窮湯 治傷寒裏實譫語狂妄

芡窮分三 大黃炒剉各一兩 甘草炙剉半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服

柴胡湯 治傷寒熱實煩躁譫語

柴胡

去苗

人參

黃芩

去黑心各一兩

犀角

鎊

朴硝

茯神

去木各三分

甘草

炙剉半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半煎七分去滓溫服

人參柴胡湯 治傷寒經六七日不解默默煩心腹中

乾燥大腹結澀譫言妄語

人參

三分

柴胡

去苗一兩

芍藥

知母

黃芩

去黑心

大黃

剉微炒

姜蕤

半夏

湯洗七遍焙

甘草

炙各半兩

右粗擣篩每服五錢水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去滓溫服

黃芩散

治傷寒煩熱不解譫言妄語欲發狂走

黃芩

去黑心

甘遂

熬炒黃

龍膽

去蘆頭各一兩

右粗擣篩為散每服一錢冷水調下更令病人飲水三兩盞腹滿則吐之此方療積熱之甚

枯薑散

治傷寒發熱煩躁言語譫妄目赤口乾心神

恍惚

桔萋根

二鬱金
兩

甘草

生各
一兩

右擣羅為散每服一錢生薑蜜水調下不拘時

柴胡桂枝湯 治傷寒發汗多亡陽譫語不可下與此

和其營衛以通津液後自愈

柴胡

去苗
四兩 桂皮

去粗
黃芩心

芍藥

人參

各一
兩半

半夏

湯洗七
遍焙

甘草

炙各
一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑半分拍

碎大棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

人參湯 治厥陰病亡陽譫語驚狂者

人參

茯苓

各二兩

甘草

菖蒲

當歸

紫石英

熟地黄

各一兩

右以水五升煮取二升去滓溫服七合

人參柴胡湯 治傷寒不分陽陰汗下太早為紅靨發

大熱并譫語不得安寧宜服之

人參

二兩 柴胡

麥門冬

去心各二兩

右㕮咀分作三服水一大碗煎至七分去滓冷服熱

亦可滓再煎

犀角散

出聖惠方

治傷寒邪熱在胃譫語錯亂

犀角屑

川升麻

柴胡

去苗 葛根 剉

川芒硝

各一兩一方用馬牙硝

甘草

炙微赤剉

藍葉

各半兩

右為散每服四錢以水一中盞煎六分去滓不拘時

溫服

柴胡散

出聖惠方

治傷寒譫語頭疼壯熱百骨節疼痛

柴胡

去苗

赤芍藥

知母

梔子仁

各一兩

川升麻

黃芩

大青

川大黃

剉碎
微炒

杏仁

湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃

甘草

炙微赤剉
各三分

石膏

四兩

右粗羅為散每服四錢以水一中盞入豉五十粒煎

六分去滓不計時溫服

黃藥散

治傷寒發熱面目赤黃煩躁欲走如見鬼神

譫語不禁

黃藥

川大黃

剉碎
微炒

梔子仁

人參

去蘆
頭

檳榔

鬱金

甘草

炙微赤剉

龍膽

去蘆頭

犀角屑

各半兩

川朴硝

二兩紫苑一兩

右細羅為散每服二錢以雞子清調下蜜水調下亦

得用不拘時服

漢防已散

出聖惠方

治傷寒熱毒逼心譫語見鬼不安

漢防已

半兩

桂心

防風

去蘆頭各三分

甘草

半兩炙微赤剉

地黃

二斤研絞取汁

右搗羅為末入地黃汁中更入水一大盞調勻入銀器

中盛於甑上蒸半日取出每服三合以溫水調下
不計時

又方

出聖惠方

犀角屑

一兩

黃連

半兩

茯苓

三分

甘草

半兩

炙微赤剉

右粗為散每服五錢以水一大盞煎五分去滓不計

時溫服

生地黄散

出聖惠方

治傷寒心膈熱毒煩悶譫語失度

生地黄

三兩

玄參

各一兩

赤茯苓

各半兩

麥門冬

去心

川升麻

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右搗羅為末每服五錢以水一大盞煎五分去滓不

計時溫服

又方

出聖惠方

治傷寒經五六日未經發汗大便結澀譫言

妄語煩躁不安

前胡

去蘆頭

葛根

各一兩剉

川大黃

二兩剉碎微炒

右為粗散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不

計時溫服以利為度

葛根散

出聖惠方

治傷寒熱毒在裏譫言妄語體熱心躁

葛根

剉

黃芩

各一兩

川大黃

二兩剉碎微炒

柴胡

去苗

犀角

各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計時溫服以通利為度

赤茯苓飲

出聖惠方

治傷寒心臟虛熱譫語恍惚不定

赤茯苓

一兩半

牡蠣

一兩燒為粉

龍骨

一兩半

黃芩

一兩

右為粗散先以水二大盞入羊心一枚煮熟去羊心

次入藥五錢生薑半分煎至七分去滓不計時溫服分為二服

大承氣湯

出聖惠方

治傷寒陽明病譫語有潮熱不能食者

必有燥糞在腸胃若能食者但耳聾宜服此湯下之

川大黃

二兩剉碎微炒

川芒硝

一兩半

枳實

三分熬炒黃

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

如人行五里再服以利為度

鉛霜散

出聖惠方

治傷寒得汗後心狂譫語欲走

鉛霜

細研

馬牙硝

人參

去蘆頭

鬱金

茯神

各半兩

甘草

一分炙微赤剉

右細羅為散每服二錢不計時煎麥門冬湯溫調下

鬱金散

出聖惠方

治傷寒發班譫語大便不通心腹脹滿欲

走

鬱金

三分

三川大黃

一兩半剉碎微炒

梔子仁

三分

柴胡

去苗半兩

甘草

一分炙微赤剉

犀角屑

半兩

右細羅為散每服二錢煎葱豉湯下如人行十里再服大便通利為度

朱砂散

出聖惠方

治傷寒伏熱在心脾譫言狀如癡人

朱砂

細研

太陰元精

各半兩
細研

犀角屑

一兩鉛霜

半兩
細研

紫石英

三分
細研
水飛過

人參

去蘆頭

赤茯苓

防風

各一兩
去蘆頭

訶梨勒皮

三分

右細羅為散入上件四味同研令勻每服二錢葱湯

調下不計時

傷寒發斑論

夫傷寒發斑陽盛故也其病在表或未經發汗或已發汗未解或吐下後邪熱不除毒氣內盛因表虛熱毒乘虛出於皮膚發為斑疹如錦紋若色赤及發在五日内者可治若色黑過七日乃發難治甚則喉舌身體皆成瘡也歌云溫毒成斑肌肉焦石膏一劑毒須消若還黑毒乘虛出疹痘斑瘡別有條大抵發斑不可用表藥蓋表虛裏實若發其汗重令開洩則斑爛也咽痛元參升

麻湯斑出大青四物湯又名阿膠大青湯又豬膽雞子
湯近用升麻葛根湯最良下部生瘡咳而下利嘔吐青
汁眼赤口瘡者黃連橘皮湯斑瘡豌豆黃連一物煮濃
汁服大妙青黛大如棗服之又青木香煮湯汁服瘡出
煩疼者五物木香湯犀角大青湯芒硝豬膽塗瘡法証
治論化証湯乃白虎加人參湯別名也孫兆用紫雪有
下証者調胃承氣湯又云溫毒渾身似錦紋發斑癰疹
嘔吐頻或時咳逆心煩悶冬感於寒發在春溫毒黑膏

方嘔青汁者葛根橘皮湯夫熱病在裏已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁譫語此為表虛裏實熱燥於外故身體發斑如錦紋凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也又歌曰血如溫毒黑膏良熱病重陽別有湯裏實表虛因發出若還發汗愈增瘡病証屬陽誤投溫藥或當汗不汗或當下不下或當汗下未解陽熱內然蒸濕外迫熱毒入胃以致發斑蓋熱必傷血血熱不散裏實表虛由是熱氣乘虛出於皮膚輕則

如痲子重則如錦紋是也斑家慎勿發汗汗之重令開洩斑爛又加多也凡斑畧見一二須早圖又曰稍延獨陽絕陰不可救藥其發黑斑者熱劇胃爛無及矣然而斑文方萌與蚊跡類焉又不可誤用藥也發斑多見於胸腹蚊跡多在手足之間關前陽脉洪大病人昏潰先紅後赤者斑也陽脉不洪病人自靜先紅後黃者蚊跡也發斑屬陽陽毒具而陰脉形或大極自利或怫鬱氣短而燥糞久不得通盧扁復生莫能施其巧溫毒發斑

冬月冒寒至春間陽盛則發病凡吐下而表未解毒未
消也黑膏主之肌肉斑爛咳而心悶下利嘔吐清汁下
部病或口瘡黃連橘皮湯葛根橘皮湯熱病發斑時氣
發斑大青四物湯猪膽雞子湯陽毒曰重陽發斑有舌
乾咽痛者元參升麻湯發斑通用升麻葛根湯敗毒散
犀角地黃湯熱多者元參升麻湯加生薑烏梅又黃連
一物湯青木香一物湯可擇用有下証者少與調胃承
氣湯孫兆用紫雪一劑証治論用白虎加人參湯發斑

湯劑須以紫草川芎為佐血熱內結者與小柴胡湯發斑小點稀疏色常鮮細者易治或如錦紋癰起并塌者難治若初發色紅漸次微點良久點又轉其面色肌肉黧晦者斷不可救初發便如黑誌亦然赤斑五死一生黑斑十死凡內外熱熾汗下不解煩悶咳嘔足冷耳聾便是發斑之証

方

漏蘆散

出聖惠方

治傷寒斑出癰疹如錦紋而咳嗽心神煩

悶嘔吐不止

漏蘆

陳橘皮

湯浸去白穰焙

前胡

去蘆頭

麻黃

去根節

黃芩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁
麩炒微黃各一兩

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不拘

時溫服

黃芩湯

出聖惠方

治傷寒臟腑壅毒不得宣疎肌膚發斑

黃芩

大青

川升麻

石膏

以上各一兩

梔子仁

半兩 川朴硝

二兩

右為散每服五錢以水一大盞半入豆豉五十粒葱
白二莖生薑半分煎至五分去滓不拘時溫服稍
利為度

又方

出聖
惠方

犀角屑

兩

川大黃

二兩剉
碎微炒

梔子仁

半兩

藍葉

一兩

川升麻

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不拘

時溫服

黃芩散

出聖惠方

治傷寒十日內未得汗表裏有熱發斑狂

言欲走眼目俱黃心中煩悶大便秘不利

黃芩

大青

川升麻

川大黃

剉碎微炒各一兩

甘草

半兩炙微赤剉

茵陳

一兩

川朴硝

一兩

梔子仁

半兩

黃連

半兩去鬚

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉三七片煎至

五分去滓不計時溫服以利為度

大青散

出聖惠方

治傷寒身面發斑

大青一兩半 川升麻二兩 甘草二兩炙

微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入豆豉小半合煎至

五分去滓溫服不計時

猪膽雞子湯

出聖惠方

治傷寒斑瘡欲出脉洪大心躁熱但

令患人溺於紙上如金色是也宜服此

猪膽汁

合一鬴醋合雞子

一枚打破去黃

右相和煎三兩沸放溫頓服強人盡服羸人六七次

服汗出愈

升麻散

出聖惠方

治傷寒熱毒不解欲變成斑服此解毒

川升麻

梔子仁

大青

黃芩

甘草

炙微赤剉一兩

石膏

二兩

右為散每服五錢以水一大盞入生地黃汁半合煎

至六分去滓不計時溫服

犀角散

出聖惠方

治傷寒赤斑不止

犀角屑

麻黃

去根節

梔子仁

黃連

去鬚

地骨皮

甘草

炙微赤剉

馬牙硝

鬱金

以上各一兩

石膏

二兩

右為散每服五錢以水一大盞煎至五分去滓不計時溫服以瘡為度

治傷寒黑斑出不止宜服

川升麻

兩一

黃芩

半一

兩

川大黃

碎一

微炒

犀角屑

半一

兩

半

兩

兩

川芒硝

兩一

梔子仁

兩一

兩

右為散每服二錢煎甘豆湯放冷調下不拘時以差為度

天竺黃散 治傷寒發斑瘡已出心臟尚有餘熱不除

發斑煩躁

天竺黃

研

川升麻

子芩

茯神

去木

犀角屑

赤芍藥

人參

去蘆頭

鉛霜

研以上各半兩

麥門冬

去心焙乾一兩

甘草

炙微赤剉半兩

梔子仁

一兩

黃連

一分去鬚

右為散入研了藥令勻每服一錢煎竹葉湯下不計

時

黃連散

治傷寒斑毒不解

黃連

一兩去鬚

犀角屑

半兩

石膏

二兩

梔子仁

一兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓不計

時溫服

阿膠湯 治傷寒一二日及十餘日發黃疸斑出皆主

之一名大青四物湯

大青

四兩
微赤剉

黃明膠

半兩杵碎炒令
黃燥亦用阿膠

豉

五兩

右細剉和勻每服半兩以水一中盞煎至六分去滓

不拘時

又方

大黃

三兩

甘草

二兩

杏仁

三十粒

芒硝

五合

麻黃

二兩

黃芩

一兩

巴豆

二十粒

右熬擣蜜和丸如大豆每服三丸當利毒利不止米飲止之家人視病者亦可先服取利則不相沾染也此丸亦可預合置

犀角湯

治傷寒熱毒內盛身發赤斑

犀角

鎊

麻黃

去根節

石膏

各一兩

山梔子仁

一兩半

黃連

去三分

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

山梔子湯

治傷寒發斑心躁煩亂

山梔子仁

三分

大青

升麻

各一兩

阿膠

炒令燥半兩

右搗篩每服五錢用水一盞半入豉百粒同煎至一

盞去滓

麻黃葛根湯

治傷寒發斑狀如錦紋嘔逆煩悶

麻黃

去根節

葛根

剉

知母

焙

陳橘皮

湯浸去白焙

黃芩

去黑心各一兩

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒

甘草

炙各半兩

右搗篩每服五錢水一盞半去滓溫服

犀角散

治傷寒毒氣外攻皮膚發狂躁熱

犀角

鎊黃芩去黑心

大青

馬牙硝

另研黃連去鬚

麥門冬

去心焙各一兩

山梔子仁

牛黃

另研赤茯苓去黑皮

天竺黃

另研甘草半兩

麝香

另研一錢

右搗研為散每服三錢煎竹葉湯調下不計時

石膏湯 治傷寒發黑斑

石膏

一兩半

麻黃

去根

桂

去粗皮一兩半

葛根

一兩

黃連

故鞋

一隻去土細剉

蜀椒

去目并閉口炒出汗一分

右搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服衣

覆取汗

知母湯 治傷寒毒氣滋盛蒸於肌膚發為赤斑通身

大熱頭痛精神昏亂

知母

焙

牽牛子

炒

山梔子仁

大黃

剉

黃芩

炒

黃芩

去黑心

牡丹

去心

麻黃

去根節
一兩

荊芥穗

硝石

虎杖

射干

羌活

去蘆頭

杏仁

各一分

連翹

半兩

半夏

一錢以
生薑二

錢同搗捻作餅子暴乾

右搗粗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

黃芩湯

治傷寒發斑煩躁除胃內瘀熱

黃芩

去黑心
一兩

山梔子仁

甘草

炙一兩

馬牙硝

半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不計

時

黃連散 治傷寒發斑

黃連

去鬚
一兩

檳榔

剉半
兩

甘草

炙半
兩

右搗羅為散每服二錢入蜜少許如點湯放溫服不

計時

玄參升麻湯 治傷寒失下不當下之熱毒在胃發斑

如錦文甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

升麻

玄參

甘草

炙各
半兩

右剉為散每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服

溫毒亦能發

化斑湯 治斑毒

人參

石膏

各半兩

姜蕤

知母

甘草

各一分

右剉散每服五錢水一盞半入糯米一合煎八分取

米熟為度去滓溫服

香豉湯

治肺腑臟暴氣斑點

香豉

一升綿裹熬

葱鬚

切一兩

石膏

八兩碎

梔子仁

三兩擘

生薑

六兩

大青

二兩

升麻

三兩

芒硝

三兩

右切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒硝分為三服

麻黃解肌湯 一二日便服之

麻黃 甘草 升麻 芍藥 石膏
各一兩

杏仁 三十枚 貝齒 三枚

右末之以水三升煮取一升頓服取汗出即愈便食
豉粥補虛即宜也

又方

麻黃

二兩黃芩

桂

各一兩

生薑

三兩

右以水六升煮取二升分為四服

葛根解肌湯

葛根

四兩

芍藥

二兩

麻黃

大青

甘草

黃芩

石膏

桂

各一兩

大棗

四枚

右以水五升煮取二升去滓分為三服微取汗

升麻湯

治大人小兒傷風寒溫疫頭痛發熱體疼斑

瘡已發未發均可服

升麻 乾葛 甘草 芍藥

各等分

右咬咀每服五錢水二盞煎七分去滓熱服小兒量與一法加紫草茸煎

鼠粘子散 治傷寒斑瘡毒氣盛脉洪盛大便秘澀咽膈不利或致疼痛語聲不出

鼠粘子炒 丹參 升麻 甘草炙 乾薄荷葉

右等分每服三錢水二盞半煎至七分去滓不計時服凡似感風熱而咽疼聲重類疹証皆宜服之

煮萍飲 治斑瘡甚者

青萍

紫萍

各一握
淨洗

右煮羹吃三服

神仙紫雪

黃金

十兩

寒水石

石膏

各四兩
八錢

犀角

羚羊角

各一兩

元參

一兩
六錢

沉香

木香

丁香

各半兩


甘草

八錢升麻

六錢

右以水五升煮黃金至三升去金入諸藥再煎至一

升濾去滓投朴硝三兩二錢微大火煎以柳木篦
子攪勿停手候欲凝入盆中更下研朱砂麝香各
三錢急攪令勻候冷凝成雪也每服一錢細細嚥
之



普濟方卷一百三十三